



## 牡蛎碳酸钙颗粒说明书

## 请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称: 牡蛎碳酸钙颗粒

英文名称: Oyster Shell Calcium Granules

汉语拼音: Muli Tansuan' gai Keli

【成份】 本品每包含牡蛎碳酸钙按钙计50毫克。辅料为枸橼酸、淀粉、蔗糖、 柠檬黄。

【性状】 本品为淡黄色颗粒, 味酸甜。

【作用类别】 本品为矿物质类非处方药药品。

【适应症】 用于预防和治疗钙缺乏症,如骨质疏松、手足抽搐症、骨发育不全、 佝偻病以及儿童、妊娠和哺乳期妇女、绝经期妇女、老年人钙的补充。

【规格】 每包按钙计50毫克

【用法用量】 口服。一次1~2包,一日3次,用温开水冲服。

【不良反应】 1. 嗳气、便秘。2. 偶可发生奶-碱综合征,表现为高血钙、碱中毒及肾功能不全。(因服用牛奶及碳酸钙、或单用碳酸钙引起)。3. 过量长期服用可引起胃酸分泌反跳性增高,并可发生高钙血症。

【禁忌】 高钙血症、高钙尿症、含钙肾结石或有肾结石病史患者禁用。

【注意事项】 1. 心肾功能不全者慎用。

- 2. 对本品过敏者禁用, 过敏体质者慎用。
- 3. 本品性状发生改变时禁止使用。
- 4. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 5. 儿童必须在成人监护下使用。
- 6. 如正在使用其他药品, 使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】1.本品不宜与洋地黄类药物合用。2.大量饮用含酒精和咖啡因的饮料以及大量吸烟,均会抑制钙剂的吸收。3.大量进食富含纤维素的食物能抑制钙的吸收,因钙与纤维素结合成不易吸收的化合物。4.本品与苯妥英钠及四环素类同用,二者吸收减少。5.维生素D、避孕药、雌激素能增加钙的吸收。6.含铝的抗酸药与本品同服时,铝的吸收增多。7.本品与噻嗪类利尿药合用时,易发生高钙血症(因增加肾小管对钙的重吸收)。8.本品与含钾药物合用时,应注意心律失常的发生。9.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品参与骨骼的形成与骨折后骨组织的再建以及肌肉收缩、神经传递、凝血机制并降低毛细血管的渗透性等。

【贮藏】 密封,在干燥处保存。

【包装】 药品包装用复合膜、袋,5克/包,10包/盒。

【有效期】 暂定24个月

【执行标准】 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第十一册 WS-10001-(HD-1037)-2002

【批准文号】 国药准字H20066813

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】林州市史家河工业园区

【说明书修订日期】2019年12月01日

【生产企业】

企业名称:海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址: 林州市史家河工业园区

邮政编码: 456592

电话号码: 0372-6515111 传真号码: 0372-6515111

## 如有问题可与生产企业联系



最新版药品说明书请扫描二维码