



西咪替丁片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：西咪替丁片

英文名称：Cimetidine Tablets

汉语拼音：Ximitiding Pian

【成份】本品每片含西咪替丁0.2克，辅料为淀粉、蔗糖、十二烷基硫酸钠、硬脂酸镁、羧甲淀粉钠。

【性状】本品为白色片。

【作用类别】本品为抗酸类非处方药药品。

【适应症】用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

【规格】0.2克

【用法用量】口服。成人一次1片，一日2次，24小时内不超过4次。

【不良反应】

- 1.长期用药或加大剂量时可出现：男性乳房肿胀、泌乳现象、性欲减退、腹泻、眩晕或头痛、肌痉挛或肌痛、皮疹、脱发等。
- 2.偶见的不良反应有：①精神紊乱，多见于老年或重病患者，停药后48小时内能恢复；②咽喉痛热；③不明原因的出血或瘀斑，以及异常倦怠无力；④粒细胞减少或其他异常血象，多见于合并症严重之患者。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

- 1.本品连续使用不得超过7天，症状未缓解请咨询医师或药师。
- 2.儿童、老年患者应在医师指导下使用。
- 3.下列情况慎用：严重心脏及呼吸系统疾患、系统性红斑狼疮、器质性脑病、肝肾功能不全。
- 4.如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
- 5.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 6.本品性状发生改变时禁止使用。
- 7.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 8.儿童必须在成人监护下使用。
- 9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

- 1.本品若与氢氧化铝，氧化镁等抗酸剂合用时，本品的吸收可能减少，故一般不提倡同用。
- 2.本品与硝西泮（硝基安定）、地西泮（安定）、茶碱、普萘洛尔（心得安）、苯妥英钠、阿司匹林等同用时，均可使这些药物的血药浓度升高，作用增强，出现不良反应，甚至是毒性反应，故本品不宜与这些药物同用。
- 3.本品与氨基糖苷类抗生素如庆大霉素等同用时可能导致呼吸抑制或呼吸停止。
- 4.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品能明显抑制昼夜基础胃酸分泌，也能抑制由食物、组胺、五肽胃泌素、咖啡因与胰岛素等所诱发的胃酸分泌。

【贮藏】 密封保存。

【包装】 口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100片/瓶。

【有效期】 24个月。

【执行标准】 中国药典2025年版二部

【批准文号】 国药准字H41023008

【上市许可持有人】 海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】 林州市史家河工业园区

【说明书修订日期】 2025 年 10 月 01 日

【生产企业】

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372—6515111

传真号码：0372—6515111

如有问题可与生产企业联系



最新版药品说明书请扫描二维码