



阿司匹林片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：阿司匹林片

英文名称：Aspirin Tablets

汉语拼音：Asipilin Pian

【成份】 本品每片含阿司匹林0.3克。辅料为玉米淀粉、枸橼酸、滑石粉。

【性状】 本品为白色片；

【作用类别】 本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适应症】 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

【规格】 0.3克

【用法用量】 口服。4~8岁儿童，一次0.5片；8~14岁儿童，一次1片；14岁以上儿童及成人，一次1~2片；若持续发热或疼痛，可间隔4~6小时重复用药1次，24小时不超过4次。

【不良反应】 1. 较常见的有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等胃肠道反应。

2. 较少见或罕见的有（1）胃肠道出血或溃疡，表现为血性或柏油样便，胃部剧痛或呕吐血性或咖啡样物，多见于大剂量服药患者。（2）支气管痉挛性过敏反应，表现为呼吸困难或哮喘。（3）皮肤过敏反应，表现为皮疹、荨麻疹、皮肤瘙痒等。（4）血尿、眩晕和肝脏损害。

【禁忌】 1. 孕妇、哺乳期妇女禁用。

2. 哮喘、鼻息肉综合征、对阿司匹林和其他解热镇痛药过敏者禁用。

3. 血友病或血小板减少症、溃疡病活动期患者禁用。

【注意事项】

1. 本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过3天，用于止痛不超过5天，症状未缓解请咨询医师或药师。

2. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。

3. 年老体弱患者应在医师指导下使用。

4. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。

5. 痛风、肝肾功能减退、心功能不全、鼻出血、月经过多以及有溶血性贫血史的患者慎用。

6. 发热伴脱水的患儿慎用。

7. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 儿童必须在成人监护下使用。

12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 本品不宜与抗凝血药（如双香豆素、肝素）及溶栓药（链激酶）同用。
2. 抗酸药如碳酸氢钠等可增加本品自尿中的排泄，使血药浓度下降，不宜同用。
3. 本品与糖皮质激素（如地塞米松等）同用，可增加胃肠道不良反应。
4. 本品可加强口服降糖药及甲氨蝶呤的作用，不应同用。
5. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品能抑制前列腺素合成，具有解热、镇痛作用。

【贮藏】密封，在干燥处保存。

【包装】 口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100片/瓶；1000片/瓶。

【有效期】 24个月。

【执行标准】中国药典2025年版二部。

【批准文号】 国药准字H41021761

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】林州市史家河工业园区

【说明书修订日期】2025年10月01日

【生产企业】

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372—6515111

传真号码：0372—6515111



最新版药品说明书请扫描二维码

如有问题可与生产企业联系